

La PreP et Prévention en ambulatoire

Retour d'expérience et pratiques

14/06/2021


Dr Julien ARTIGNY

julien.artigny@gmail.com

Introduction

Une différence importante

Orientation(s)



Pratique(s)

HSH Chem/Slam

FSF BDSM

Travailleur·euses du sexe

Orientation(s)

2 fois plus de risques

d'EDC, de pensées suicidaires et de tentative de suicide chez les personnes LGB. (1)

25% des symptômes dépressifs

actuels chez les personnes LGB sont liés aux violences liées à l'orientation sexuelle.

Fréquence et types de violences familiales subies par les HSH# cohabitant avec des membres de leur famille durant le premier confinement lié à la Covid-19 (N=867), ERAS Covid19, France, 2020

	Effectifs	%
HSH résidant avec au moins un membre de leur famille durant le premier confinement	2 467	
Toutes violences familiales	868	35,2
Dévalorisations, remarques ou injures par une personne résidant dans le logement	863	35,0
Dévalorisation par une personne dans le logement	601	24,4
Remarques désagréables sur l'apparence physique	482	19,5
Insultes ou injures	351	14,2
Agressions physiques ou sexuelles par une personne résidant dans le logement	71	2,9
Agressions physiques	64	2,6
Agressions sexuelles	11	0,5

Source : ERAS Spécial Covid-2019, réalisée du 30 juin au 15 juillet 2020.

Répondants HSH résidant en France.


HSH : hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ; ERAS : Enquête Rapport au sexe.

Note : Un répondant peut avoir déclaré plusieurs types de violences psychiques et/ou physiques et/ou sexuelles. La somme des indicateurs de violences est supérieure à 100 et à l'indicateur global « toutes violences familiales ».

1. El Khoury Lesueur F, Léon C, Heron M, Sitbon A, Velter A ; le groupe Baromètre de Santé publique France 2017. Santé mentale des adultes selon l'orientation sexuelle et violences subies. Résultats du Baromètre de Santé publique France 2017. Bull Epidemiol Hebd. 2021;(6-7):97-104.
2. Velter A, Rojas Castro D, Champenois K, Lydié N. Violences familiales subies par les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes lors du premier confinement lié à l'épidémie de la Covid-19. Bull Epidemiol Hebd. 2021;(6-7): 120-8.

LES LOIS SUR L'ORIENTATION SEXUELLE DANS LE MONDE

De la criminalisation d'actes sexuels entre adultes consentants de même sexe à la protection contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle



Pratique(s)

4,1% de la population masculine française âgée de 18 à 69 ans ayant eu des rapports sexuels déclaraient avoir déjà eu des pratiques sexuelles avec un partenaire du même sexe (1)

Tout médecin rencontrera au moins un HSH dans sa patientèle

En moyenne, un médecin généraliste a 1976 patients, dont 45 % d'hommes, soit une probabilité de 35 HSH dans sa patientèle, chiffre probablement sous-estimé (2).

1. Bajos N, Bozon M, Beltzer N. Enquête sur la sexualité en France: pratiques, genre et santé. Paris: Ined; 2008. 603 p.
2. Assurance Maladie. Patientèle des médecins APE (Activité Principale Exercée) par département. 2017

Mise en perspective des chiffres

La prévalence du diabète traité
pharmacologiquement en France

5,2% en 2019, soit plus de 3,5 millions de personnes
traitées pour un diabète

Quand en parler ?

PreP quand en parler ?

Consultation de dépistage

Points les vaccinations

- Voyages
- Rattrape vaccinal

La vaccination DTP à 25 ans

Questionner sur les pratiques ET orientations

Quelque soit l'orientation/pratique affirmée ou supposée par le soignant

Comment faire ?

En pratique ?

Se faciliter la vie

- Ordo et consultation types

Pensez à la continuité des soins

- Former les collègues
- Organisation si absences

Utilisation de la téléconsultation

- Pour le RO de patients connues
- Faciliter la continuer des soins

En pratique ?

Ne pas s'isoler

- **Associations**
- Psychologues
- Sexologues
- Infectiologues

Se créer un réseau relai