



Accident d'exposition au sang: Conduite à tenir

DR BISTOQUET MARIE – PRATICIEN ATTACHÉ MIT CHU MONTPELLIER

18 FÉVRIER 2019



Soins immédiats

Piqûre, coupure, contact sur peau lésée

- Ne pas faire saigner
- Nettoyer immédiatement avec de l'eau et du savon
- Rincer
- Désinfecter pendant 5min par compresse ou trempage
 - DAKIN stabilisé
 - Eau de Javel DILUÉE (100ml de javel à 2,6% + 400ml d'eau froide)



Projection sur muqueuses (buccale, oculaire)

- Laver pendant 5 min immédiatement à l'eau froide ou sérum physiologique

Dans les 4 heures suivant AES

En heure ouvrable:

- Consultation spécialisée dans département maladies infectieuses le plus proche (cf site COREVIH)
 - Évaluation du risque par médecin
 - Réalisation sérologie personnelle (VIH VHB VHC)
 - Réalisation sérologie patient source (VIH VHB VHC)
 - Si nécessaire prescription TPE

Soir, week-end et jours fériés:

- Consultation service d'accueil des urgences de l'hôpital le plus proche
 - Réalisation sérologie personnelle
 - Si possible réalisation sérologie patient source
 - Prescription TPE pour 72h
 - Programmation consultation spécialisée pour réévaluation dans les 72h



TPE – VIH

Dans les 48h suivant l'AES

Objectif: éviter transmission VIH suite AES

Modalité: trithérapie antirétrovirale (Emtricitabine/Ténofovir + Rilpivirine) pendant 28 jours

Risque et nature de l'exposition	Statut VIH de la personne source		
	Positif		Inconnu
	CV détectable	CV < 50 copies/ml	
Important : – piqûre profonde, aiguille creuse et intravasculaire (artérielle ou veineuse)	TPE recommandé	TPE non recommandé*	TPE recommandé
Intermédiaire : – coupure avec bistouri – piqûre avec aiguille IM ou SC – piqûre avec aiguille pleine – exposition cutanéomuqueuse avec temps de contact > 15 mn	TPE recommandé	TPE non recommandé*	TPE non recommandé
Faible : – piqûres avec seringues abandonnées – crachats, morsures ou griffures, autres cas	TPE non recommandé		



TPE – VHB / VHC

VHB

Sérovaccination dans les 72h à 7 jours
+/- Immunoglobuline si patient source
porteur virémie positive et absence
Ténofovir prescrit



VHC

Pas de TPE pour le VHC
Surveillance sérologique simple

Ne pas oublier ...



Abréviations

AES = Accident d'Exposition au Sang

TPE = Traitement Post Exposition