



Prévention combinée VIH

DR BISTOQUET MARIE – PRATICIEN ATTACHÉ MIT CHU MONTPELLIER

19 FÉVRIER 2019






— Traitement VIH



— prep



— Préservatifs



— Dépistages



— Réduction des risques




— Traitement d'urgence



CONTRE LE VIH
UN ÉVENTAIL
DE POSSIBILITÉS

Réduction Des Risques



Préservatif

Protection IST

Efficacité théorique 98%

Efficacité réelle 64-80%

Interne / externe

Utilisation matériel unique

Chemsex / slam



Vaccination

Hépatite A

Hépatite B

Papilloma virus (HPV)

Méningocoque C





TasP = Treatment as Prevention

Transmission Hétérosexuelle:

- Réduction de 93% (IC95%: 78-98) du risque relatif de transmission du VIH avec traitement précoce (*HPTN 052*)
- 0 à 1 contamination pour 38 500 relations non protégée (*SupervieV, BrebantR (UMRS1136, INSERM et Université Pierre et Marie Curie, Paris)*)

Transmission Homosexuelle:

- Absence de transmission intra-couple (*PARTNER*)
- 0 à 1 contamination pour 7 600 relations non protégée (*SupervieV, BrebantR (UMRS1136, INSERM et Université Pierre et Marie Curie, Paris)*)

Transmission Materno-foetale:

- Aucun cas de transmission materno-foetale si CV <50cp/ml et ARV initiés avant grossesse (*Mendelbrot et al; HIV/AIDS, CID 2015*)

PrEP = Prophylaxie Pré-Exposition



Utilisation de médicaments antirétroviraux en prévention de l'acquisition du VIH chez des personnes non infectées

Indications :

- HSH et transgenres
- Couples sérodifférents (en absence TasP)
- Situations individuelles :
 - UDI avec partage de seringues
 - personnes en situation de prostitution exposée à des rapports sexuels non protégés
 - personne en situation de vulnérabilité exposée à des rapports sexuels non protégés à haut risque de transmission du VIH

Contre indications :

- séropositivité au VIH ou sérologie VIH inconnue
- signes ou symptômes d'infection aiguë par le VIH
- troubles rénaux avec créatinine <60 ml/min ou signes de tubulopathie
- allaitement
- hypersensibilité à l'un des principes actifs ou des excipients du produit.

Modalités


Prise continu : un comprimé tous les jours

- homme : 7 jours pour être « protégé »
- femme : 21 jours pour être « protégé »

Suivi: Consultation tous les 3 mois

- Contrôle biologique standard
- Dépistage IST + Sérologie

Prise discontinu : (uniquement pour les hommes)



Outils et indications dépistage VIH

Indications

Qui ?

Populations Clés

HSH
UDI
Personnes originaires pays forte prévalence



une fois par an

Population Générale



au moins une fois
entre 15 et 70 ans

Quand ?

dès que possible

Signes cliniques ou biologiques primo-infection / immunodépression

Contextes particuliers :

IST, Tuberculose, Cancer, Viol, Incarcération...

Acteurs et Outils

Professionnels de santé

Médecins libéraux
CeGIDD
Médecine universitaire
Médecine du travail
Séjour hospitalier / SAU

SEROLOGIE



Associations

TROD

Individu lui-même

AUTO-TEST



Consentement
libre et éclairé

Confidentialité
et possibilité
anonymat

Accessibilité